

Schéma de vaccination pour les personnes à risque d'infection à méningocoque B.

Vaccin	Âge de la première dose	Schéma de primovaccination	Rappel
<b>Bexsero®</b>	Nourrissons de 2 à 3 mois	3 doses (intervalle entre les doses d'un mois minimum)	1 dose entre 12 et 15 mois (intervalle d'au moins six mois entre primovaccination et rappel)
	Nourrissons de 3 à 5 mois	2 doses (intervalle entre les doses de deux mois minimum)	1 dose entre 12 et 15 mois (intervalle d'au moins six mois entre primovaccination et rappel)
	Nourrissons de 6 à 11 mois	2 doses (intervalle entre les doses de deux mois minimum)	1 dose au cours de la 2e année de vie (intervalle d'au moins deux mois entre primovaccination et rappel)
	Nourrissons de 12 à 23 mois	2 doses (intervalle entre les doses de deux mois minimum)	1 dose (intervalle de douze à vingt-trois mois entre primovaccination et rappel)
	Enfants de 2 à 10 ans	2 doses (intervalle entre les doses d'un mois minimum)	Nécessité non établie
	Adolescents à partir de 11 ans et adultes	2 doses (intervalle entre les doses d'un mois minimum)	Nécessité non établie