

		التطعيمات الإلزامية للرضع												
العمر المناسب	شهر واحد	شهران	3 أشهر	4 أشهر	5 أشهر	6 أشهر	11 شهرًا	12 شهرًا	16-18 شهرًا	6 سنوات	11-13 سنة	14 سنة	25 سنة	65 سنة وأكثر
مرض السل (BCG)														
اللقاح الثلاثي (DTP) والسعال الديكي														
المستدمة النزلية النوع ب														
الالتهاب الكبدى (ب)														
المكورات الرئوية														
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية														
المكورات السحائية ACWY														
المكورات السحائية (ب)														
فيروس الروتا														
فيروس الورم الحليمى البشري (HPV)														
الإنفلونزا														
كوفيد-19														
الهربس النطاقي														
الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)*														

مرض السسل (BCG)

يوصى عادةً بالتطعيم ضد مرض السسل للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالسسل وهم في عمر شهر واحدٍ وحتى 15 عامًا من العمر.

الديفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال والسعال الديكي (DTcaP)

تُعطى الجرعات في الأعمار المحددة في جدول التطعيم. بالنسبة للأفراد غير المطعمين، يُنفذ التطعيم التعويضي على 3 جرعات مع فاصل زمني مدته شهران بين الجرعة الأولى والثانية وواصل زمني مدته 6 أشهر بين الجرعة الثانية والثالثة.

ينبغي للنساء الحوامل تلقي جرعة من لقاح الديفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال والسعال الديكي (DTcaP) مع كل حمل لحماية أطفالهن.

المستدمية النزلية (Hib)

بالنسبة للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح، يمكن تلقي اللقاح التعويضي حتى سن 5 سنوات.

الالتهاب الكبدى (ب)

في حال عدم التطعيم خلال السنة الأولى من العمر، فيمكن إعطاء اللقاح حتى فترة سن 15 عامًا. وابتداءً من سن 16 عامًا، لا يوصى به إلا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالالتهاب الكبدى (ب).

المكورات الرئوية

التطعيم إلزامي للرضع، ويمكن إجراء التطعيم التعويضي حتى عمر 24 شهرًا. يوصى بهذا التطعيم أيضًا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

نسبة للأشخاص المولودين من عام 1980 فصاعدًا، فإن كونهم محدثين يعني تلقي جرعتين من اللقاح يفصل بينهما شهر واحد على الأقل (أو 3 جرعات إذا تم تلقي الجرعة الأولى قبل 12 شهرًا).

المكورات السحائية ACWY

التطعيم إلزامي للأطفال الرضع حتى عمر 24 شهرًا. يمكن إجراء التطعيم التعويضي حتى سن الخامسة. بالنسبة للمراهقين والشباب البالغين الذين لم يتم تطعيمهم قبل سن 14 عامًا، يُمنح إعطاء جرعات تعويضية من التطعيم بين سن 15 و24 عامًا.

المكورات السحائية (ب)

التطعيم إلزامي للأطفال الرضع حتى عمر 24 شهرًا. يمكن إجراء التطعيم التعويضي حتى سن الخامسة. بالنسبة للمراهقين غير المطعمين، فيمكن إجراء التعويض بين سن 15 و24 عام.

فيروس الروتا

يُوصى به لجميع الرضع بداية من عمر شهرين. يلزم إعطاء جرعتين إلى ثلاث جرعات (عن طريق الفم) حسب نوع اللقاح.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصى بالتطعيم للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا إلى 14 عامًا، مع التعويض حتى فترة سن 26 عامًا.

الإنفلونزا

يوصى بتلقي اللقاح كل عام، وخاصةً للأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات: الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة بما في ذلك الأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون السمنة (مؤشر كتلة الجسم > 40 كغ/م²). يمكن أيضًا إعطاء لقاح الإنفلونزا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 17 عامًا.

كوفيد-19

في الحريف للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالإنفلونزا بالإضافة إلى الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو العرف أو متلازمة داون.

يوصى بالتطعيم في الربيع للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، والمقيمين في مؤسسات كبار السن ذوي الحاجة إلى المساعدة "EHPAD" والمقيمين في وحدات العناية طويلة المدة "USLD"، والأشخاص المصابين بضعف المناعة بغض النظر عن أعمارهم.

الهريس النطاقي

يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. تلزم جرعتان متباعدتان بشهرين على الأقل.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر. كما يوصى به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والذين يعانون أمراض تنفسية مزمنة (وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن) أو أمراض قلبية (وخاصة قصور القلب).

لمعرفة المزيد



Le site de référence qui répond à vos questions

ألديك سؤال؟ أو تحتاج نصيحة؟
تحدث إلى متخصص الرعاية الصحية

