

2026

Basitleştirilmiş
aşı takvimi

Bebekler için zorunlu aşılar

Uygun yaş	1 ay	2 ay	3 ay	4 ay	5 ay	6 ay	11 ay	12 ay	16-18 ay	6 yaş	11-13 yaş	14 yaş	25 yaş	65 yaş ve üzeri
BCG														
DTP ve Boğmaca													Her 20 yılda bir	Her 10 yılda bir
Menenjit														
Hepatit B														
Pnömonok														
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (KKK)														
Meningokoklar ACWY														
Meningokok B														
Rotavirüs														
HPV														
Grip														Her yıl
Covid-19														Her yıl
Zona hastalığı														
RSV*														75 yaş ve üzeri

*Bebekler, ya gebelikte anne aşılanarak ya da doğumdan sonra RSV'ye karşı aşılanmalıdır.

Tüberküloz (BCG)

Tüberküloz riski yüksek olan çocuklara, 1 aylıktan 15 yaşına kadar aşı yapılması önerilir.

Difteri-Tetanoz-Polio Boğmaca (DTP)

Aşılar, aşı takviminde belirtilen yaşlarda uygulanır. Daha önce aşılanmamış kişilerde, eksik aşıların tamamlanması için 3 doz uygulanır; 1. ve 2. doz arasında 2 ay, 2. ve 3. doz arasında ise 6 ay beklenir.

Hamile kadınlara, bebeklerini korumak amacıyla her hamilelikte bir doz dTcaP aşısı yapılması önerilir.

Haemophilus Influenzae tip b (Hib)

Aşılanmamış çocuklarda, 5 yaşına kadar eksik aşılar tamamlanabilir.

Hepatit B

Aşı, bebeklik döneminde yapılmadıysa 15 yaşına kadar (bu yaş dahil) uygulanabilir. 16 yaşından itibaren ise yalnızca Hepatit B riski taşıyan kişilere önerilir.

Pnömonokok

Bu aşı bebekler için zorunludur. 24 aya kadar olan çocuklarda eksik aşılar tamamlanabilir. Ayrıca, 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere de önerilir.

Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (KKK)

1980 ve sonrasında doğan kişilerde aşıların güncel olması, en az bir ay arayla 2 doz aşı yapılmış olması anlamına gelir (ilk doz 12 aydan önce yapılmışsa 3 doz gerekir).

Meningokoklar ACWY

Bu aşı 24 aya kadar olan bebekler için zorunludur. Eksik aşılar 5 yaşına kadar tamamlanabilir. 14 yaşından önce aşılanmamış ergen ve genç yetişkinlerde, 15-24 yaş arasında eksik aşıların tamamlanması önerilir.

Meningokok B

Bu aşı 24 aya kadar olan bebekler için zorunludur. Eksik aşılar 5 yaşına kadar tamamlanabilir. Aşılanmamış ergenlerde, 15-24 yaş arasında eksik aşıların tamamlanması mümkündür.

Rotavirüs

2 aydan itibaren tüm bebeklere önerilir. Aşının türüne bağlı olarak ağızdan 2 veya 3 doz şeklinde uygulanır.

İnsan papilloma virüs (HPV)

11-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına aşılama yapılması, 26 yaşına kadar da tamamlayıcı aşılama yapılması önerilmektedir.

Grip

GRIP : Aşı, her yıl özellikle komplikasyon riski taşıyan kişilere önerilir: 65 yaş ve üzerindeki, bazı kronik hastalığı olan kişiler (6 aydan itibaren çocuklar dahil), hamile kadınlar ve obezite sorunu olan kişiler (VKİ > 40 kg/m²). Grip aşısı ayrıca 2-17 yaş arasındaki tüm çocuklara da önerilebilir.

Covid-19

Sonbaharda, grip aşısı önerilen risk gruplarına ek olarak; psikiyatrik hastalığı, demansı veya trizomi 21'i olan kişilere de Covid-19 aşısı önerilir.

İlkbaharda ise 80 yaş üzerindeki, EHPAD ve USLD'de kalanlara ve yaşa bakılmaksızın bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere aşı yapılması önerilir.

Zona hastalığı

65 yaş ve üzerindeki kişilere önerilir. En az 2 ay arayla 2 doz uygulanır.

RSV

75 yaş ve üzerindeki kişilere önerilir. Ayrıca KOAH gibi kronik solunum yolu hastalığı veya kalp yetmezliği gibi kalp hastalığı olan 65 yaş ve üzerindeki kişilere de önerilir.

