

التحصينات الإلزامية للرضع							
شهرين	3 أشهر	4 أشهر	5 أشهر	6 أشهر	11 شهراً	12 شهراً	16-18 شهراً
شهر واحد	مرض السل (BCG)						
	اللقاح الثلاثي (DTP) والسعال الديكي						
	المستديمة النزلية من النوع ب						
	التهاب الكبد ب						
	المكورات الرئوية						
	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية						
	المكورات السحائية ACWY						
	المكورات السحائية ب						
	فيروس الروتا						
	فيروس الورم الحليمي البشري						
	الإنفلونزا						
	كوفيد-19						
	هريس نطاقي						
	الفيرس المخولي التنفسي						

مرض السل (BCG)

يوصى عادةً بالتحصين ضد مرض السل من عمر شهر إلى 15 عامًا للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالسل.

الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال (DTP)

يوصى بإعطاء جرعات معززة للبالغين في أعمار ثابتة، أي في عمر 25 و45 و65 ثم كل عشر سنوات.

السعال الديكي

تُعطى جرعة معززة للبالغين ضد السعال الديكي في سن 25 عامًا مع إمكانية التعويض حتى سن 39 عامًا. يوصى بتحصين النساء الحوامل ضد السعال الديكي بدءًا من الثلث الثاني من الحمل لحماية أطفالهن.

المستدّية النزلية من النوع ب (Hib)

بالنسبة للأطفال الذين لم يُحصّنوا قبل عمر 6 أشهر، يمكن إعطاؤهم تحصين تعويضي حتى سن 5 سنوات باللقاح الأحادي (من 1 إلى 3 جرعات حسب العمر).

التهاب الكبد ب

إذا لم يتم التحصين خلال السنة الأولى من العمر، فيمكن إعطاء اللقاح حتى سن 15 عامًا. وابتداءً من سن 16 عامًا، يوصى به فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد ب.

المكورات الرئوية

هذا التحصين إلزامي لجميع الأطفال ويوصى به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

الحصبة والتكاف والحصبة الألمانية (MMR)

بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في عام 1980 أو بعده، فإن عبارة محدّث تعني أنهم حصلوا على جرعتين من اللقاح.

المكورات السحائية ACWY

أصبح التطعيم إلزاميًا لجميع الأطفال منذ 1 يناير/كانون الثاني 2025، بجرعة واحدة في عمر 6 أشهر تليها جرعة معززة في عمر 12 شهرًا. ويوصى به أيضًا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا و14 عامًا.

المكورات السحائية ب

منذ يناير/كانون الثاني 2025، أصبح هذا التطعيم إلزاميًا لجميع الأطفال بعمر 3 و5 و12 شهرًا.

فيروس الروتا

يوصى به لجميع الأطفال من عمر شهرين. من الضروري إعطاء جرعتين إلى ثلاث جرعات (عن طريق الفم) اعتمادًا على اللقاح.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصى بالتحصين للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا إلى 14 عامًا، مع التعويض حتى سن 19 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بالتحصين للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) حتى سن 26 عامًا.

الإنفلونزا

يوصى بالتحصين كل عام، وخاصةً للأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات: الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة بما في ذلك الأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم > 40 كجم/م²). يمكن أيضًا إعطاء لقاح الإنفلونزا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 17 عامًا.

كوفيد-19

يوصى بهذا التحصين في الخريف للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالإنفلونزا بالإضافة إلى الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو الخرف أو متلازمة داون.

يوصى بالتحصين في الربيع للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، والمقيمين في مؤسسات كبار السن ذوي الحاجة إلى المساعدة "EHPAD" والمقيمين في وحدات العناية طويلة المدة "USLD"، والأشخاص المصابين بضعف المناعة بغض النظر عن أعمارهم.

الهربس النطاقي

يوصى بالتحصين للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

الفيروس المخلوي التنفسي (VRS)

يوصى بالتحصين للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ويعانون من التهابات الجهاز التنفسي المزمنة.

لمعرفة المزيد



Le site de référence qui répond à vos questions



هل لديك سؤال؟ أو نصيحة؟
تحدث إلى متخصص الرعاية الصحية

