

结核病百日咳菌苗（卡介苗）

通常建议1月龄至15岁的结核病高危儿童接种结核病疫苗。

百日咳-破伤风-脊灰三联疫苗(DTP)

建议成人在25岁、45岁和65岁时接种，此后每十年接种一次。

百日咳菌苗

成人在25岁时接种百日咳菌苗，39岁之前可以补接种。建议孕妇从妊娠中期开始接种百日咳疫苗，以保护胎儿。

乙型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib)

对于6月龄前未接种过该疫苗的儿童，可以在5岁前补接种单价疫苗（根据年龄接种1至3剂）。

乙型肝炎

如果未在出生后第一年接种该疫苗，可在15岁（含15岁）前补接种。从16岁开始，仅建议具有乙型肝炎风险的人群接种该疫苗。

肺炎疫苗

所有婴儿都必须接种该疫苗，建议65岁及以上老人接种。

麻疹-腮腺炎-风疹三联疫苗(ROR)

对于1980年以后出生的人来说，及时接种是指已接种了两剂疫苗。

ACYW群脑膜炎球菌多糖疫苗

自2025年1月1日起，所有婴儿均应接种该疫苗：6月龄时接种第一剂，12月龄接种一剂加强针。此外，还建议11至14岁青少年接种该疫苗。

乙型脑膜炎疫苗

自2025年1月起，所有婴儿均应在3月龄、5月龄和12月龄时接种该疫苗。

轮状病毒疫苗

建议所有2月龄以上的婴儿接种。根据不同疫苗的不同要求，需口服两到三剂。

人乳头瘤病毒疫苗(HPV)

建议11至14岁的男孩和女孩接种，并且可在19岁（含19岁）前补接种。此外，建议26岁以下的同性恋男士(HSH)接种该疫苗。

流感疫苗

建议每年接种，尤其是患有并发症风险的人群：65岁及以上人群、患有某些慢性疾病的人群（包括6月龄及以上儿童）、孕妇和肥胖人群（体重指数大于40 kg/m²）。所有2至17岁的儿童还可接种流感疫苗。

新冠肺炎疫苗

在秋季，除流感高危人群外，还建议患有精神疾病、痴呆症或唐氏综合症的人群接种该疫苗。

在春季，建议80岁及以上老人、疗养院和常驻护理机构的居民以及免疫力低下的各年龄段人群接种疫苗。

带状疱疹疫苗

建议65岁及以上人群接种疫苗。

呼吸道合胞病毒疫苗

建议75岁及以上人群和65岁以上患有慢性呼吸道感染的人群接种。

了解更多信息



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions