

Basitleştirilmiş aşı takvimi

[illegible]

Tüberküloz (BCG)

Verem aşısı, tüberküloz açısından yüksek risk taşıyan çocuklarda çoğunlukla 1 ay ile 15 yaş arasında önerilmektedir.

Difteri-Tetanoz-Çocuk Felci (DTP)

Yetişkinlerde ise belirli yaşlarda (25, 45, 65) ve sonrasında her on yılda bir tekrar aşı önerilmektedir.

Boğmaca

Boğmaca hastalığına karşı yetişkinlerde hatırlatma aşısı 25 yaşında yapılır ve 39 yaşına kadar aşılamaya yapılabilir. Hamileliğin 2. trimesterinden itibaren bebeklerini korumak amacıyla gebelere boğmaca aşısı yapılması önerilmektedir.

Haemophilus Influenzae tip b (Hib)

6 aydan önce aşılanmamış çocuklarda, 5 yaşına kadar monovalan aşı ile (yaşa göre 1-3 doz) telifi aşılaması yapılabilir.

Hepatit B

Aşı yaşının ilk yılında yapılmadıysa, 15 yaşına kadar ve bu yaş dahil olmak üzere yapılabilir. 16 yaşından itibaren sadece Hepatit B riski taşıyan kişilere önerilmektedir.

Pnömonokok

Bu aşı tüm bebekler için zorunludur ve 65 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (MMR)

1980 yılından sonra doğan kişiler için aşıların tamamlanmış olması, iki doz aşı yapılması olması anlamına gelir.

Meningokoklar ACWY

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm bebekler için aşılamaya zorunludur; 6. ayda bir doz, 12. ayda ise tekrar doz uygulanır. 11-14 yaş aralığındaki ergenlere de önerilmektedir.

Meningokok B

Ocak 2025'ten itibaren bu aşılamaya 3, 5 ve 12 aylık tüm bebekler için zorunlu hale getirildi.

Rotavirüs

2 aydan itibaren tüm bebekler için önerilir. Aşının türüne göre iki-üç doz (ağızdan) uygulanması gerekir.

İnsan papillom virüsü (HPV)

11-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına aşılamaya yapılması, 19 yaşına kadar da tamamlayıcı aşılamaya yapılması önerilmektedir. Ayrıca 26 yaşına kadar, erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerle (MSM) de aşı yapılması önerilmektedir.

Grip

Özellikle komplikasyon riski taşıyan kişilere her yıl aşı yaptırımları önerilmektedir: 65 yaş ve üzeri kişiler, 6 aylık ve üzeri çocuklar da dahil olmak üzere bazı kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve obezite sorunu yaşayan kişiler (BMI > 40 kg m²). Grip aşısı 2-17 yaş arasındaki tüm çocuklara da önerilebilir.

Covid-19

Sonbaharda grip nedeniyle risk altında olan kişilerin yanı sıra psikiyatrik rahatsızlığı olan, bunama veya down sendromu olan kişilere de bu aşı önerilmektedir.

İlkbaharda 80 yaş üstü kişilere, EHPAD ve USLD sakinlerine ve yaşlarına bakılmaksızın bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere aşılamaya yapılması önerilmektedir.

Zona hastalığı

65 yaş ve üzeri kişilere aşı yapılması önerilmektedir.

VRS

Aşılamaya, 75 yaş ve üzeri kişilere ve kronik solunum yolu enfeksiyonu olan 65 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

Daha fazlasını öğrenmek için



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

Bir sorunuz mu var? Bir tavsiye ister misiniz?
Bir sağlık uzmanıyla konuşun