

التلقيح: هل توأكب آخر المستجدات؟

الجدول الزمني المبسط للقاحات لعام 2022

اللقاحات الإجبارية للرضع							السن المناسب	وصف اللقاح
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا		
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	لقاح البني سي جي (BCG)
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	لقاح الخناق والكزاز وشلل الأطفال (DTP)
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	السعال الديكي
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	لقاح المستدمية النزلية "ب" (Hib)
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	التهاب الكبد الوبائي "ب"
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	المكورة الرئوية
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	لقاح الحصبة-التكاف- الحصبة الألمانية (ROR)
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	المكورات السحائية "ج"
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	المكورات السحائية "ب"
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	الأنفلونزا
شهر	شهران	3 اشهر	4 اشهر	5 اشهر	11شهرًا	12شهرًا	18-16 شهرًا	التهربس النطاقي

اللقاحات الإجبارية

الرضع قبل بلوغهم سن 18 شهرا:

- الخناق
- الكزاز
- شلل الأطفال
- السعال الديكي
- المستدمية النزلية "ب"
- التهاب الكبد الوبائي "ب"
- المكورة الرئوية
- المكورات السحائية "ج"
- الحصبة
- النكاف
- الحصبة الألمانية

الدرن (لقاح BCG)

غالبًا ما يوصى بتلقي اللقاح ضد الدرن بدءًا من سن شهر واحد وحتى سن 15 عامًا للأطفال المعرضين بشدة لخطر الإصابة بالدرن.

الخناق والكزاز وشلل الأطفال (DTP)

يوصى بتلقي البالغين لجرعات تنشيطية عند بلوغهم الأعمار 25 و45 و65 عامًا ثم كل عشر سنوات.

السعال الديكي

تأتي الجرعة التنشيطية للبالغين ضد السعال الديكي عند سن 25 عامًا مع إمكانية تلقي اللقاح الاستدراكي حتى سن 39 عامًا. ويوصى بتلقي اللقاح ضد السعال الديكي للنساء الحوامل بدءًا من الثلث الثاني من الحمل لحماية الرضيع.

المستدمية النزلية "ب" (Hib)

بالنسبة إلى الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحًا قبل سن 6 أشهر، يمكن إعطاء اللقاح الاستدراكي حتى سن 5 أعوام باستخدام اللقاح أحادي النكافو (بدءًا من جرعة واحدة حتى ثلاثة جرعات حسب السن).

التهاب الكبد الوبائي "ب"

إذا لم يتم التلقيح خلال السنة الأولى من العمر، فيمكن إعطاؤه حتى بلوغ السن 15 عامًا. ومن سن 16 عامًا، يُنصح به فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "ب".

المكورة الرئوية

ويعد تجاوز سن 24 شهرا، يوصى بتلقي هذا اللقاح للأطفال والبالغين المعرضين لخطر الإصابة بهذا الالتهاب.

الالتهاب السحائي "ب"

يمكن إعطاء اللقاح الاستدراكي حتى سن العامين للرضع الذين لم يتلقوا الجرعات الثلاث الموصى بها من اللقاحات في سن 3 أشهر و5 أشهر و12 شهرا.

المكورات السحائية "ج"

بدءًا من سن 12 شهرا وحتى سن 24 عامًا، يوصى بجرعة واحدة لمن لم يتلقَ اللقاح بعد.

الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية (ROR)

بالنسبة إلى الأشخاص من مواليد عام 1980، فإن مواكبة آخر المستجدات يعني الحصول على جرعتين من اللقاح.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصى بتلقي الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عامًا وتلقي اللقاح الاستدراكي حتى سن 19 عامًا. علاوة على ذلك، يُوصى بتلقي الرجال الذين يمارسون الجنس مع غيرهم من نفس الجنس حتى سن 26 عامًا.

الأنفلونزا

يوصى بالتلقيح كل عام، خاصة للأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات ومنهم: كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بمن في ذلك الأطفال الرضع بدءًا من سن 6 أشهر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم < 40 كجم/متر مربع).

التهربس النطاقي

يوصى بتلقيح كبار السن ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا.

اللقاح المضاد لفيروس كورونا

يوصى بالتلقيح للجميع بدءًا من سن 5 أعوام. وغالبًا ما يشتمل جدول التلقيح الكامل على جرعتين تليهما جرعة (جرعات) تنشيطية. يمكن الاطلاع على جدول التلقيح المحدث على:

vaccination-info-service.fr

للحصول على مزيد من المعلومات



Le site de référence qui répond à vos questions

هل لديك استفسار؟ أو نصيحة؟ تحدث إلى اختصاصي رعاية صحية