

Tableau des recommandations vaccinales chez les personnes infectées par le VIH : vaccins inactivés.

Vaccins inactivés		
	Indications/recommandations	Schéma
<b>dTcaP*/dTP</b>	Recommandation identique au reste de la population (en dehors de la fréquence des rappels).	Une dose de vaccin dTcaP à l'âge de 25 ans puis dTP <b>tous les dix ans.</b>
<b>Hépatite B</b>	<p>Chez les personnes non immunisées et non infectées (Ag HBs, anticorps anti-HBs et anti-HBc négatifs).</p> <p>Contrôle du taux d'anticorps anti-HBs après vaccination et une fois par an : injection de rappel si anticorps anti HBs &lt; 10 mUI/ml.</p> <p>L'injection d'une dose vaccinale (20 µg) peut être réalisée chez les sujets présentant un anticorps anti-HBc isolé ; en l'absence de réponse anti-HBs à un mois, une vaccination complète doit être réalisée.</p>	Trois injections double-dose (40 µg) espacées d'un mois et 4e injection double-dose six mois plus tard.
<b>Hépatite A</b>	<p>Chez les personnes non immunisées (IgG anti-VHA négatifs) présentant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ une hépatopathie chronique</li> <li>▪ ou une co-infection VHC ou VHB</li> <li>▪ ou des risques d'exposition : HSH** et usagers de drogues en intraveineux.</li> </ul> <p>Contrôle du taux d'Ac IgG anti-VHA un à deux mois après la seconde injection.</p>	Une dose, puis un rappel six mois à un an après (voire trois à cinq ans après en cas de pénurie).
<b>Pneumocoque</b>	Recommandé chez toutes les personnes.	Une dose de vaccin 13-valent suivie d'une dose de vaccin 23-valent au moins deux mois après.
<b>Méningocoque C</b>	Recommandé jusqu'à l'âge de 24 ans.	Une dose de vaccin.
<b>HPV</b> ( <i>Papillomavirus humain</i> )	<p>Chez les filles dès l'âge de 11 ans jusqu'à 19 ans révolus.</p> <p>Chez les garçons dès l'âge de 11 ans et jusqu'à 19 ans révolus (26 ans pour les HSH**).</p>	Chez la jeune fille : trois doses selon l'AMM (M0, M2, M6). Chez le garçon, trois doses de vaccin quadrivalent (M0, M2, M6).
<b>Grippe saisonnière</b>	Recommandé chez toutes les personnes, quels que soient le taux de CD4 et la charge virale.	Une injection annuelle.
<b>Pour tous sauf le vaccin anti-grippal</b>	Vaccination après que la charge virale VIH plasmatique ait été rendue indétectable sous antirétroviraux et avec un taux de CD4 supérieur à 200/mm <sup>3</sup> .	

\* Diphtérie-tétanos-polio-coqueluche acellulaire.

\*\* Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.