

Tableau des recommandations vaccinales chez les personnes infectées par le VIH : vaccins vivants atténués.

Vaccins vivants atténués		
	Indications/recommandation	Schéma
BCG	Contre-indiqué, quel que soit le taux de CD4.	NA*
Zona	Contre-indiqué, quel que soit le taux de CD4.	NA*
Fièvre jaune	Obligatoire pour les résidents du département de la Guyane. Taux de CD4 supérieur à 200/mm ³ .	Une injection.
ROR	Taux de CD4 supérieur à 200/mm ³ . Sérologie rougeole préalable systématique. Sérologie rubéole préalable systématique chez la femme en âge d'avoir des enfants.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deux doses espacées d'au moins un mois chez les personnes non immunisées contre la rougeole. ▪ Une dose chez les femmes en âge de procréer et séronégatives pour la rubéole mais séropositives pour la rougeole.
Varicelle	Après sérologie varicelle (vaccination si négative). Si le taux de CD4 est supérieur à 200/mm ³ et en l'absence de grossesse en cours.	Deux injections avec un intervalle de quatre à huit semaines entre les deux doses chez les personnes séronégatives.
Pour tous les vaccins vivants	Vaccination après que la charge virale VIH plasmatique ait été rendue indétectable sous antirétroviraux (sauf pour le BCG et le vaccin contre le zona qui restent contre-indiqués).	

*NA : non applicable