

Tableau récapitulatif des vaccinations pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Vaccins contre	Schéma vaccinal
<p>Diphtérie (d) Tétanos (T) Poliomyélite (Polio)</p>	<p>Rappel à 65, 75, 85 ans, etc.</p>
<p>Grippe</p>	<p>1 dose annuelle.</p>
<p>Zona</p>	<p>1 dose unique. La vaccination est recommandée chez les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus. Ce vaccin vivant atténué est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées.</p> <p><b>Rattrapage :</b> Durant la première année de disponibilité du vaccin, les personnes âgées de 75 à 79 ans révolus peuvent être vaccinées dans le cadre d'un rattrapage.</p>
<p>Pneumocoque</p>	<p><b>Pour les personnes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque</b></p> <p><b>Immunocompétentes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPV23 une dose unique</li> </ul> <p><b>Immunodéprimées, syndrome néphrotique, brèche ostéo-méningée, implants cochléaires ou candidat à l'implantation :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non vaccinées antérieurement : 1 dose de VPC13 ; suivie d'1 dose de VP23 huit semaines plus tard.</li> <li>▪ Vaccinées depuis plus d'un an avec VP23 : 1 dose de VPC13. Revaccination par VP23 avec un délai d'au moins cinq ans après le dernier VP23.</li> <li>▪ Vaccinées antérieurement avec la séquence VPc13-VP23 : 1 dose de VP23 avec un délai d'au moins cinq ans après le dernier VP23.</li> </ul> <p><i>VPC13 : vaccin pneumococcique conjugué 13-valent.</i> <i>PPV23 : vaccin pneumococcique non conjugué 23-valent.</i></p>
<p>Coqueluche acellulaire (ca)</p>	<p><b>Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning :</b> 1 dose de dTcaPolio revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal de un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio).</p> <p><b>Pour les personnes non vaccinées à l'âge adulte et en situation de cocooning :</b> 1 dose de vaccin dTcaPolio.</p>
<p>Hépatite A</p>	<p><b>Pour les personnes exposées à un risque particulier :</b> 2 doses selon le schéma : 0,6 mois Si la personne est née avant 1945, une sérologie préalable est fortement recommandée, à la recherche d'anticorps témoins d'une immunité ancienne.</p>