

Tableau récapitulatif des recommandations vaccinales pour les patients adultes ayant reçu une chimiothérapie.

Vaccins vivants atténués après la chimiothérapie		
ROR	Adultes nés à compter de 1980. Au moins six mois après l'arrêt de la chimiothérapie. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaccination complète avant traitement : une dose. ▪ Non préalablement vaccinés ou vaccinés avec une dose : schéma général à deux doses séparées d'un mois. 	
Varicelle	Chez les personnes dont la sérologie est négative . Au moins un an après la chimiothérapie. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Systématiquement chez les patients à risque de rechute. ▪ Selon les recommandations du calendrier vaccinal en vigueur chez les patients considérés guéris. 	
Fièvre jaune	Attendre au moins six mois après l'arrêt de la chimiothérapie. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si jamais vacciné ou si sérologie fièvre jaune négative (IgG <10) 	
Vaccins inactivés		
	En cours de chimiothérapie	Après la chimiothérapie
Pneumocoque	Une dose de vaccin conjugué 13-valent (Prévenar 13 [®]) suivie d'une dose de vaccin non conjugué 23-valent (Pneumovax [®]) après un délai d'au moins deux mois.	Si déjà vacciné par Prevenar 13-Pneumovax [®] : nouvelle injection de Pneumovax [®] après cinq ans Si haut risque d'infection à Pneumocoque : répéter la séquence Prevenar13 [®] - Pneumovax [®] à distance de trois mois de la chimiothérapie.
Hépatite B	Pour les patients non immunisés (AgHBs négatif, anticorps anti-HBc et anti-HBs négatifs) exposés au risque d'infection par le VHB, trois injections selon le schéma M0, M1, M6. Contrôle des anticorps anti-HbS un mois après la dernière injection.	Six mois après l'arrêt de la chimiothérapie, une injection supplémentaire chez les personnes exposées au risque d'infection par le VHB.
Grippe saisonnière	Une injection annuelle.	Une injection annuelle*.
Méningocoque C	Non indiqué.	Patients âgés de 2 à 24 ans révolus, trois mois après l'arrêt de la chimiothérapie (patients vaccinés ou non).
dTPca**	Non indiqué.	Une dose de vaccin, systématiquement trois mois (tumeur solide) ou six mois (hémopathie maligne) après l'arrêt de la chimiothérapie.

* Avis d'expert: une revaccination réalisée à au moins un mois d'intervalle peut être recommandée en période épidémique chez les patients vaccinés en début de saison et encore en traitement par chimiothérapie.

** Diphtérie-tétanos-poliomyélite-coqueluche acellulaire.