

Tableau du traitement du choc anaphylactique. Auto-injecteurs d'adrénaline (AIA) :  
dosages, noms commerciaux, indications.

Dosage ( $\mu\text{g}$ )	Noms commerciaux	Indications en fonction du poids
150	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anapen<sup>®</sup> 150 <math>\mu\text{g}</math>/3 ml</li><li>▪ Emerade<sup>®</sup> 150 <math>\mu\text{g}</math></li><li>▪ Epipen 0,15/0,3 ml<sup>®</sup></li><li>▪ Jext 150 <math>\mu\text{g}</math><sup>®</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Poids de 7,5 kg à 25 kg*</li></ul>
300	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anapen<sup>®</sup> 300 <math>\mu\text{g}</math>/0,3 ml</li><li>▪ Emerade<sup>®</sup> 300 <math>\mu\text{g}</math></li><li>▪ EpiPen<sup>®</sup> 0,3 mg/0,3 ml</li><li>▪ Jext<sup>®</sup> 300 <math>\mu\text{g}</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Poids &gt; 25 kg</li><li>▪ Poids &gt; 60 kg</li></ul>
500	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Emerade<sup>®</sup> 500 <math>\mu\text{g}</math></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Poids &gt; 60 kg</li></ul>

\* Pour les enfants de moins de 15 kg, il n'existe pas d'AIA adapté.  
Toutefois, en cas de risque vital, l'utilisation d'un AIA dosé à 150  $\mu\text{g}$  est préconisée  
par la Société française de médecine d'urgence, dès 7,5 kg.