

Sérogroupe du cas index d'IIM	Contact sans antécédent de vaccination	Contact avec antécédent de vaccination contre le sérogroupe correspondant au cas index
IIM C	De 6 à 8 semaines : Nimenrix® De 2 à 3 mois révolus* • NeisVac® ou Menjugate® : 2 doses à au moins deux mois d'intervalle et un rappel au cours de la 2e année de vie. De 4 à 11 mois révolus* • Menjugate® : 2 doses à au moins deux mois d'intervalle et un rappel au cours de la 2e année de vie • NeisVac® : 1 dose et un rappel au cours de la 2e année de vie A partir de 12 mois • NeisVac® ou Menjugate® : 1 dose unique	Si vacciné depuis plus de cinq ans avec un vaccin conjugué : Rappel en fonction de l'âge à la 1re vaccination • si âge < 5 ans à la 1re vaccination: rappel • si âge > 5 ans à la 1re vaccination: pas de rappel
		Si vacciné depuis moins de cinq ans avec un vaccin conjugué : • Pas de rappel
		Si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué (bivalent A+C) : • NeisVac® ou Menjugate® : 1 dose unique
IIM A ou W ou Y	A partir de 6 semaines • Nimenrix® : 2 doses espacées de deux mois et rappel à 12 mois A partir de 12 mois • Nimenrix® : 1 dose unique A partir de 2 ans • Nimenrix® ou Menveo® : une dose unique	Si vacciné depuis plus de trois ans : • Nimenrix® ou Menveo® : 1 dose de rappel
IIM B	Pas de vaccination systématique sauf recommandation particulière : épidémie ou grappe de cas	