

Vaccin	Âge de la première dose	Schéma de primovaccination	Rappel
Bexsero®	Nourrissons de 2 à 5 mois	Deux doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les doses de 2 mois minimum)	Une dose entre 12 et 15 mois (intervalle d'au moins six mois entre primovaccination et rappel)
	Nourrissons de 6 à 11 mois	Deux doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les doses de 2 mois minimum)	Une dose au cours de la 2 ^e année de vie (intervalle d'au moins deux mois entre primovaccination et rappel)
	Enfants de 12 à 23 mois	Deux doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les doses de 2 mois minimum)	Une dose (intervalle de douze à vingt-trois mois entre primovaccination et rappel)
	À partir de 2 ans	Deux doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les doses d'un mois minimum)	Selon les recommandations officielles, une dose de rappel tous les 5 ans peut être envisagée chez les sujets présentant un risque continu d'exposition à infection méningococcique
Trumenba®	À partir de 10 ans	Deux doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les doses de 6 mois minimum)	Une dose de rappel peut être envisagée à la suite de chacun des deux schémas posologiques chez les sujets présentant un risque continu d'infection invasive à méningocoque
		Trois doses de 0,5 ml chacune (intervalle entre les 2 premières doses d'un mois minimum et d'au moins 4 mois entre la 2 ^e et la 3 ^e dose)	