اللقاحات: هل أجريت التحديثات اللازمة؟

2019 الروزنامة المبسّطة للقاحات

						اللقاحات الالزاميّة للرضّع المولودين ابتداءً من 1 يناير 2018							
* 5 Co 65	Lic Rs	4625	4674	46 73.77	~(ec/6	***18.76	(Kitz	Ling	* Kiljs	Kijq	الان چ	Ki 7	العمر المناسب
													BCG
كل 10 أعوام													ديفتيريا – تيتانوس – شلل الأطفال
													السعال الديكي
													النزلة النزفية » (HIB) من الفنة «ب
													التهاب الكيد «ب» B
													المكورات الرنوية
													الالتهاب السداني » C «سى
													الدصبة — النكاف — الدصبة الألمانيّة
													فيروس الورم (HPV) الدُليمي البشري
کل عام													الانفلونزا
													القوباء المنطقية

لدى الرضّع المولودين ابتداءً من 1 يناير 2018، اللقاحات ضد الديفتيريا، شلل الأطفال، التيتانوس، النزلة النزفيّة من الفئة «ب»، إلتهاب الكبد من الفئة «ب»، السعال الديكي، الحصبة، النكاف، الحصبة . الألمانيّة، المكوّرات الرئوية والالتهاب السحائي إلزاميّة

BCG (السل)

بشكل مرتفع

ما معنى «إجراء التحديثات اللازمة»؟

يعنى «إجراء التحديثات اللازمة» الحصول على اللقاحات اللازمة حسب العمر ومع العدد الصحيح من الحقن لتأمين الحماية

إذا لم تكن لقاحاتي وفق «التحديثات

ليس من الضروري إعادة إجراء كل شيء من جديد، يكفى متابعة التلقيح انطلاقاً من المرحلة التي توقفت فيها. يتم التحدّث عن .««الاستدراك

دي زمل قفرعمل

الموقع المرجعي للإجابة على أسئلتكم

VACCINATION

INFO SERVICE.ER

رالتهاب السحايا «سي C

ابتداءً من عمر 12 شهراً وحتى عمر 24 عاماً ضمناً، يوصى بإجراء جرعة واحدة للذين لم يخضعوا للتلقيح سابقأ

الحصبة – النكاف – الحصبة الألمانية

للأشخاص المولودين ابتداءً من عام 1980، يعنى إجراء التحديث الحصول على جرعتين من اللقاح

(HPV) فيروس الورم الحليمي البشري

يوصى بإجراء اللقاح للفتيات بين عمر 11 و14 عاما. يمكن اجراء لقاح الاستدراك حتى عمر 19 عاماً ضمناً. يوصبي بإجراء اللقاح للرجال الذين يمارسون علاقات جنسيّة مع رجال (علاقات جنسيّة مع المثيل) حتى عمر 26 عاماً.

يوصي بإجراء اللقاح، كل عام، خاصة للأشخاص المعرّضين لتعقيدات: الأشخاص بعمر 65 عاماً وأكثر، والأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك الأطفال ابتداءً من عمر 6 أشهر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من السمنة

القوياء المنطقية

يوصى بإجراء اللقاح لدى الأشخاص بعمر 65 إلى 74 عاماً ضمناً

إذا لم يتم إجراء التلقيح خلال العام الأول من الحياة، يمكن إجراؤه حتى عمر 15 عاماً ضمناً. ابتداءً من عمر 16 عاماً، يوصى بإجراء التلقيح فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بإلتهاب «الكبد «ب

يوصى بإجراء التلقيح ضد السل ابتداءً من 1 شهر وحتى عمر

15 عاماً لدى بعض الأطفال المعرضين لخطر الاصابة بالسل

يوصى بإجراء لقاحات التذكير عند أعمار ثابتة أي 25، 45، 65

يتم إجراء لقاح التذكير في عمر 25 عاماً. يعنى الأمر بشكل خاص

الأبوين المتوقِّعَيْن، لأن التَّلقيح يحمى الرضَّع الَّذين يقلَّ عمرهم عن

الديفتيريا - التيتانوس - شلل الأطفال

عاماً وبعد ذلك كل عشرة أعوام

.6 أشهر الذين لم يُستكمل تلقيحهم

المكور ات الرنوبة

بعد 24 شهراً، يوصى بإجراء هذا التلقيح في حالات خاصة





