



Las vacunas contra la difteria, la poliomielitis, el tétanos, el *Haemophilus b*, la hepatitis B, la tosferina, el sarampión, las paperas, la rubéola, el neumococo y el meningococo son **obligatorias para los niños menores de 18 meses**.

### ¿Qué significa estar «al día»?

«Estar al día» significa haber recibido las vacunas necesarias según la edad y el número correcto de dosis para estar protegido.

### ¿Qué pasa si no tengo mis vacunas «al día»?

No es necesario volver a empezar, basta con reanudar la vacunación en la fase en la que se interrumpió. Se llama «ponerse al día».

Para obtener más información



La página web de referencia que responde a sus preguntas

### BCG (tuberculosis)

Se recomienda la vacunación contra la tuberculosis en edades comprendidas entre 1 mes y 15 años en el caso de determinados niños expuestos a un alto riesgo de tuberculosis.

### Difteria-Tétanos-Poliomielitis

Las dosis de refuerzo para los adultos se recomiendan a edades fijas de 25, 45 y 65 años, y después cada 10 años.

### Tosferina

La dosis de refuerzo de la tosferina se administra a los 25 años. Los futuros padres están especialmente involucrados porque la vacunación protege a los niños menores de 6 meses cuya vacunación no está completa.

### Hepatitis B

Si no se ha realizado la vacunación durante el primer año de vida, puede realizarse hasta los 15 años inclusive. A partir de los 16 años, únicamente se recomienda a aquellas personas con riesgo de contraer hepatitis B.

### Neumococo

A partir de los 24 meses. Se recomienda la vacunación en situaciones específicas.

### Meningococo C

A partir de los 12 meses y hasta los 24 años inclusive. Se recomienda una única dosis a aquellas personas que no estén ya vacunadas.

### Sarampión-Paperas-Rubéola

Para las personas nacidas a partir de 1980, estar al día significa haber recibido dos dosis de la vacuna.

### Virus del papiloma humano (HPV)

Se recomienda la vacunación de las niñas de 11 a 14 años, con una actualización hasta los 19 años de edad. La vacunación de los varones a las mismas edades está vigente desde el 1 de enero de 2021. Además, se recomienda la vacunación de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) hasta los 26 años.

### Gripe

Se recomienda la vacunación todos los años, sobre todo a las personas con riesgo de complicaciones: las personas mayores de 65 años, las que padecen ciertas enfermedades crónicas, incluidos los niños mayores de 6 meses, las mujeres embarazadas y las personas obesas (IMC > 40 kg/m<sup>2</sup>).

### Herpes zóster

Se recomienda la vacunación a las personas de 65 a 74 años inclusive.

¿Una pregunta? ¿Un consejo? Hable con su médico, farmacéutico, matrona o enfermera.