



Для младенцев, рожденных после 1 января 2018 г., прививки от дифтерии, полиомиелита, столбняка, гемофильной инфекции типа b, гепатита В, коклюша, кори, паротита, краснухи, пневмококка и менингококка **обязательны**.

### Что значит, «соблюдать сроки»?

«Соблюдать сроки», значит делать прививки в соответствии с возрастом и количеством инъекций, которые необходимы для защиты.

### Если я «выбиваюсь» из графика прививок?

Это не значит, что нужно все начинать сначала, следует возобновить цикл прививок с этапа, где он был прерван. Мы называем это «наверстать упущенное».

Более подробные сведения



На этом сайте вы найдете ответы на ваши вопросы

### БЦЖ (туберкулез)

Прививку от туберкулеза рекомендуется делать детям, начиная с 1 месяца после рождения и до достижения 15 лет - для детей подверженных повышенному риску заражения.

### Дифтерия-Столбняк-Полиомиелит

Повторные прививки для взрослых рекомендуются проводить в следующем возрасте: 25, 45 и 65 лет, после чего раз в 10 лет.

### Коклюш

Повторная прививка от коклюша выполняется в 25 лет. Это особенно касается будущих родителей, поскольку вакцинация защищает младенцев младше 6 месяцев с незавершенной вакцинацией.

### Гепатит В

Если в первый год жизни прививка не была сделана, ее можно сделать до 15-летнего возраста. После 16 лет прививка рекомендована лицам, подверженным риску заражения гепатитом В.

### Пневмококковая инфекция

После 24 месяцев выполнение такой прививки рекомендуется в особых случаях.

### Менингококковая инфекция С

После 12 месяцев и до достижения полных 24 лет для лиц, не получивших прививку, рекомендуется инъекция одной дозы.

### Корь-Паротит-Краснуха

Для рожденных после 1980 года понятие «соблюсти график прививок» означает получение двух доз вакцины.

### Папиллома человека (ВПЧ)

Вакцинация рекомендована девушкам возраста с 11 до 14 лет, «наверстать» прививку можно до наступления полных 19 лет. Вакцинация рекомендована мужчинам, имеющим сексуальные связи с мужчинами (MSM), до достижения ими возраста в 26 лет.

### Грипп

Прививку рекомендуется делать ежегодно, в особенности при риске осложнений: лицам старше 65 лет и лицам с определенными хроническими заболеваниями, в том числе детям с 6-месячного возраста, беременным женщинам и страдающим ожирением.

### Инфекция вирусная Varicelle-Zoster

Вакцинация рекомендована пожилым людям, от 65 до 74 лет включительно.

**Вопрос? Нужен совет? Обратитесь к вашему лечащему врачу, аптекарю, акушерке или медсестре.**

