

疫苗接种：您是否保持最新状态？

2021年 简化疫苗接种日程表

适合年龄	婴儿强制疫苗接种							6岁	11-13岁	14岁	25岁	45岁	65岁及以上
	1个月	2个月	4个月	5个月	11个月	12个月	16-18个月						
卡介苗	■												
白喉-破伤风-脊髓灰质炎		■	■		■			■	■		■	■	■ 每10年
百日咳		■	■		■			■	■		■		
乙型流感嗜血杆菌(HIB)		■	■		■								
乙型肝炎		■	■		■								
肺炎球菌		■	■		■								
丙型脑膜炎球菌				■		■							
麻疹-腮腺炎-风疹						■	■						
人类乳头瘤病毒(HPV)								■	■				
流感													■ 每年
带状疱疹													■

常规接种疫苗

18个月以下的婴儿必须进行白喉、小儿麻痹症、破伤风、乙型嗜血杆菌、乙型肝炎、百日咳、麻疹、腮腺炎、风疹、肺炎球菌和脑膜炎球菌疫苗接种。

“保持最新状态”是什么意思？

“保持最新状态”是指已接受相应年龄所需的疫苗接种，并且实施了正确注射次数以保证保护效果。

如果我接受的疫苗接种没有“保持最新状态”怎么办？

您不必从头开始，只需从之前停止的阶段开始接种即可。这称为“补种”。

卡介苗（结核病）

对于结核病风险高的儿童，建议在1个月至15岁之间接种结核病疫苗。

白喉-破伤风-脊髓灰质炎

建议在特定年龄（即25岁、45岁、65岁）进行后续疫苗接种，然后每十年注射一次。

百日咳

百日咳在25岁时进行后续疫苗注射。这对即将做父母的人来说特别重要，因为疫苗接种可以保护不足6个月的婴儿，这时他们的免疫接种尚不完全。

乙型肝炎

如果在出生后的第一年内未进行疫苗接种，则可以在15岁之前（包括15岁）进行接种。如果年龄为16岁以上，建议仅对有乙型肝炎风险的人群进行接种。

肺炎球菌

年龄超过24个月后，建议仅在特殊情况下才接种该疫苗。

丙型脑膜炎球菌

如果年龄在12个月至24岁之间（含边界值），建议尚未接种疫苗的人注射一剂。

麻疹-腮腺炎-风疹

对于1980年以后出生的个人来说，保持最新状态的意思是接种两次疫苗。

人类乳头瘤病毒(HPV)

建议在年龄在11至14岁之间的女孩接种疫苗，在19岁之前（包括19岁）可以补种一次。自2021年1月1日起，已经对同龄男孩进行了疫苗接种。此外，建议26岁以下的男男性行为者接种疫苗。

流感

建议每年接种疫苗，尤其是对于有并发症风险的人群：65岁及以上的人群、患有某些慢性疾病的人群（包括6个月年龄的儿童）、怀孕女性和肥胖人群（BMI>40kg/m²）。

带状疱疹

建议65岁至74岁之间（含边界值）的人群接种疫苗。

了解更多



如有疑问，请访问此参考网站

有问题吗？需要建议？请与您的医生、药剂师、助产士或护士交谈。